

Notes

of 17

Book 19th
of Notes

Travels in 1818

Book 19th

24 Oct Sat 1818

Turkey Run (hilly broad)	3
Union 12 log. 2 ton	5
Jonathan Cr bridge, 2 miles	1/2
Rent new broken bridge	3
Jonath. Valley left limey bottom	
Thompson river bridge	2
Butnam 100 ft W Muskingum	3
Musking Valley 2 bridges	
Zanesville 500 ft 3 banks	
Musk farm & Canal Comp	
Zanesville hills sandstone	6

25 Oct Sunday

Salt Cr. W bank hollow sand stone	1
Salt Cr. bridge deep valley high hills	1
high ridge of sandstone you drew on	2
either side big	
Grooked Creek end of ridge	
Will Creek Valley of Creek	
half 2 times	
Will Creek goes in Musk 23 miles	
West Zanesville bridge	
Cambridge on hill 40 ft 6 ton. Count	
house	
Met to day 25 Wagons we have 6 ox	
12 Cows to hogs 30 sheep 185 people	to W

26 Oct. Mon.

S. Ridge	high, crooked	1
Beetle Cr. - goes in Sub fork	5	
Salt fork of Wills Creek	2	
Branch fork of Do	4	
Winchester 2 h. 2 tare	2 $\frac{1}{2}$	
End of branch fork Valley pass to high ridge, view back	2	
Lovettsburg 3. tare - G. Harper	2 $\frac{1}{2}$	
15 Wyo. 136 South		

27 Oct. Tues.

Hope Creek (high) 28	2
Syrupma 1 tare, 6 h. C. tare Embden Cr	2
Stellwater Cr. C. tare, of 100 ft. 1 $\frac{1}{2}$	
Swampy valley part	
Bugay fork (all running North w/Mont)	1
Moorfield 20 h. 2 tare, 3 tare 2 $\frac{1}{2}$	
Vienne 1 t. 3 h	4
Branch fork of Stellwater Cr	2
End of Valley of Do from hills	4
Mechanicsville 4 t 2 p	1
Cathy on high hill 30 h	1

31 Oct. Sat.

To up hill Ch Cr	1
In low cut across valley	1
Glen	
Rush	

28 Oct. Wed.

Bloomfield 2 t & 3 h	11
hill of fine farmland broken	
running North many low	
Croft Creek, mill building. 6	
feet of road to	
high hills, junction of	3

29 Oct. Thurs.

Strasburgville (hill, some	5
Gentry - small	1
Holiday Inn (Strasburg Cr)	4
Along at, mills broken	
up Hembree run end of it	1
Virginia side, Maryland side	
5 miles Church in Gap	3
Croft roads 15 h. 2 tare, Church	4
fine farms, swelling	
30 Oct. Fri.	17

30 Oct. Fri.

Racoon Cr. mill two	3
Loudon Cr (branch) two parts	1
Bethel Church (branch)	11
Moy Linn Coal Shallow hills	
D. B. Co. Coal mine	
Chintimine Creek 1	
	4
	20

Poissons de Pittsburg

1. Missouri Sucker - N. G. Diff flat dots
over body 2 Nag. dorso. branch wide on
both sides. *Leptostoma fuscum*
long 2 pds, brownish, Venter bluish
breath whitish, gills greenish.
2. Vient aux print. rare, chirostom à un
3. Anguilla - Nein d'espis jaune dessous
Ventre gris. — et - ventre gris.
4. Trout - 40 mls. de Pitts. dans les
fontaines de l'Allegheny.
5. Dace - rare
6. Megachirus paradoxus -
7. Lamprey - 8 inches long cut out mouth
8. Salmon - taken in Lake of Ohio -
9. Buffalo - rare in winter
10. Leptothenus - thought poisonous
this good to eat when skinned
11. Catfish platirhynchus
12. Perca salvelinus - in Feb. March
13. Carp
- 14.
- 15.
16. Mr. Boltman Pittsburg

From New London to Newhaven

1815.

Head river	—	5 miles
Lime	1 1/2	6 1/2
Gerry Connect.	16	
Seybrook	0	
River	17	
Seybrook	19	
Huntingworth	27	
Guildford	37	
Brandford	43	
East Haven	48	
Newhaven	52	

Brooklyn to New Bedford 3 m

Jamaica 9

Little Memphis	2
Hempstead	4
to Jericho	9
Moswitz	6
Oyster Bay	3
	38 m ¹

From N. Y. to Clermont

1815. Manors 116 m. 110 direct

Fortje & Mankattonville	— 8 m
Ling's bridge & river	— 5 —
Barking town	— 14
Sing-sing	— 5
Catliback river & town	— 6
Pack's Kill & etc	— 6.
Warren's tow	— 13
Fish kill	— 12
Duughkeepie	— 14
Hudson park t	— 5
Rinebeck or flats	— 11
Redhook	— 6.
Clermont manor	— 8
Clerm town 3	
— manors 6.	
	110.

16, Nov 1818 Pittsburg 3 million
On the wharf 2 Boats
33 Sailboats
55 Arks
7 flats
5 Wood Ships


102
3 Steamboats

Albany fishes

Sturgeon	Surgeon
Shad	Shad
St. Roaf	Streaked bass
Herring	Herring
Dace	Trout
Salmon	Catfish
Pike	Pike
Eel	Eel
Bass	Sunfish
Chub	Chub
Corporal	Corporal
Sucker	Sucker
Perch	Perch
White fish	White fish
Horn Chub	Horn Chub
Horn Sucker	Horn Sucker

3 Planaria - Shores Run 1818

- (1) 1. Brown 2 eyes
- 2. Greenish 2 eyes
- 3. Brown 4 eyes, Vent marginated

 Brown Larva?

1816


Alb to Gibsonville or Washington	6 m
to Troy	1
to Lansingburg (Diam Rock)	3
Waterford	1
Cohoes bridge 1 $\frac{1}{4}$. Cohoes falls 3 $\frac{1}{4}$	2

L. Remained Native; Charleston
Mr. Ward, Richmond owner of
the Virginia Museum



Megalisma maculata
Bank de Terre noire
Diam. 6 p. globulus
oval, non flottant, aff. *Megastoma* —
Brun à taches diverses glabres en forme de carreaux
bordé au grande partie d'argente, inter.
avec tout extérieur, plis & ondulations —
Mobile volont, contractible, 2 p. pourat
à l'humidité —

Stevenson mills 2 m W. Bedford
in Oct. 1818 raffed
going West 4419 Seals.
East 2979 Do.



Cheeks fall.
Taw & ruf.
Interv. bluish.
Endule bright
venter darkish

Taw &
ruf.

2 *Phormia lutescens*
Poraf. Gal. n. 1
Jaw & ruf. dif.
pl. forw. diffus
orange bei jungen
marg. diffus dist.

unperf. ruf. orange
ad. brown over pl. dist.

1. *Aphelinus* Simon. - abd. noir.
abdomen plus court que le corps. 21.

2. *Aphelinus* Simon. - V. juv. 21. abd.
très court. tête brune, capuchon
abdominal blanc. poitrine blanche
blanche, tache jaune sur les bandes

3. *Aphelinus* Simon. - Abd. noir
à 2 bandes brunes, deux fois plus
claires, antennes plus courtes. En
cuisse - appendice caudal proéminent
mais distinct. L'intérieur des fèces
jaune brûlé et la partie posté-
rieure rouge. Ant. 12 mm.

4. *Aphelinus* Campan. rugatus -
21. abd. rouge de rouge, avec de
petits traits noirs. ant. pt. courtes
appendice caudal.

Coryneaphis Wsp. Raf.
Tribble Park off N. 3217 fig 11



N.G.

Echinius glandaria

3. + 4. ♀. 11; petiole olive
peignante d'oursins.

3. *Culicoides* torquatus L. Vembre orange. gorge
blanche. Cuisse dorée des ventouses
Lits. Quing. - 12 inches



4. *Grenibulus*

abdomen très étroit
petite tache blanche, larmes
3 longues taches noires à la
base du type.



5. *Agriocnemis concavus*

abdomen très étroit et étroit
tache blanche, larmes
petite tache blanche concave
larmes. Dorsum. de 2 longues

Carpiophthorus Pentatomidae. 21. 13. #36. 37
Partius. Org. stem. Asterias or Echinocactus
from Arizona pag 235. Dr. Woodhouse.
Kentucky. Nut shell (Dr. Mitchell Spec)



6. *Mesplites* from
Louisiana brown,
3 lignes Hanches
M. interruptus

Pittsburg Dr. Trout
Agitated
Joel Lewis
Benton
Louisville Jos. Naselede
Kentucky Dr. Jos. Wheelwright.

Fornicaria J. Ferrier
mortitans —

Dans les bancs du Kentucky il existe
des nids de 4 pieds coniques à plus
bouche, se jetant sur une couche
grasse en les dérangeant.

Grand Nat'. crat. noir biseauté
Abdomen assez grand obtus lèvre

5. *Fornicaria minima* Herd. Am
Ext. rouge débruyé même le pieds et
yeux longueurs env. 3 lignes

N. G. *Elliptomazonatus*



genat.



genat.



sp. long



genat.



12

genat.



13

genat.



14

genat.



15

genat.



16

genat.



17

genat.



18

genat.



19

genat.



20

genat.



21

genat.



22

genat.



23

genat.

24

genat.

25

genat.

26

genat.

27

genat.

28

genat.

29

genat.

30

genat.

31

genat.

32

genat.

33

genat.

34

genat.

35

genat.

36

genat.

37

genat.

38

genat.

39

genat.

40

genat.

41

genat.

42

genat.

43

genat.

44

genat.

45

genat.

46

genat.

47

genat.

48

genat.

49

genat.

50

genat.

51

genat.

52

genat.

53

genat.

54

genat.

55

genat.

56

genat.

57

genat.

58


genat.

59


13 *Tortula muralis* Ntf
aff. *T. picta* diff. myces et forme
juste à NY. de Virginie au mas-
ché Tarragon

Coupe large elliptique, per bombée.
11 p. sur 6, cœdanes ant. supérieures
crenelées post. lèv. oviracées à levres
légères tronquées, rougeâtres. Gérons en
diffusion à taches jaunes.

Coupe inf. obtuse, corps noir
à lignes jaunes, p. noir ou gris
très longs remarquables.



14 *Fernies montana*?
Cœdane robuste. Old legs
Ant. munif. mach. grises, thorax pos-
en cours ant. abd. - ombré oblique. Caps
noir à ant et extr. des parties rouges
Athyrium blandum grise longue.



15 *Aranea* immobile

South Mt. Nvra virea a
petites griffes courtes, à lignes
lates blanches

Claytonia
Houttuynia
Trichopoma

Semprevivum majus? *Lobularia pectinatum*
16 *Rhus typhina* Cal. 5 lob. 5 pet. obs.
parap. oppos. pet. lat. 6. lob. glandulosus
5 stam alt. pet. inf. cal. Ov. villos. ouate
3 styl bruns. Stigm. glob. - Ament.
embricat. Syst. lat. adpres. flor. b.
subspiculum. fl. prim. & Germ. divisi
n. g. *Salix* - Am. obt. lep. mag. &
fem. crenat. obt. villos. apic. nigra
Phragmites - Nam 2 longif. levig.
Ovar. lgl. wat. puber. 2 Stigm. subsp. 1

Sambucus pubens

Pectula

Glechoma

Vicia Stigm. comp. villos. ouate

Polygonum

Viola pedata & Var. b. color

patens

Ceraurus 3 sp. 2 South mount.

Cal dentice fol. obscur-

Polygonum tenuif.

<i>Fernaria aurea</i>	<i>Lupinus</i>
<i>Veronica serpyllifolia</i>	<i>Aster</i>
<i>Aster triflorum</i>	<i>Veratrum</i>
<i>Erythronium</i>	<i>Anemone</i>

19 Embanija - Pittsburg Nov^o

Lang total 6 p. but the water is 1/2

Civergun 10 p.

Bee insectivore conical green. Cone long
slip plus long stbe. or rather a bit base flat
nud, tips white, margins outer convolute

Early form clear by afternoon

Differ. Aras. spars. quo bluetes, front.

Urgygo plus at quiescens urinate

Desmod. lesp. blane - Ailes brunes
cord. ext. les pures de la m. rive

Quiescens brunes, les 2 pures ext. also
chrys. v. blanches. Lang. purpuree

Famille plus rosette, diff. in

2 or 3 br. chatain quoies & gray quo also

Orne des her. Al. 3. 2 4 p. e.g. 1. 5. 6 etc

19 Sept 1818

Chaplin Louisville	bridge	2 m
to Bear graft Mill St. Bay hills	2	
to Mr. Geef Ginks Broadbury	3	
Spring Station	7	

To Bear graft Brook Plain	4	
Middleton Valley mill Bridge	3	
	7	

To Hedges Creek to Salt R. brook br

to Long run Tavern broken ground

Mutherford's Shelby Cr	2	
------------------------	---	--

Simpsonville 6 hours	3	
----------------------	---	--

Bullitt Co	2	
------------	---	--

W. Shelby (W. B. Clark) 6 salt	5	
--------------------------------	---	--

East Branch Clark Cr (Wade)	3	
-----------------------------	---	--

Waynes. Middleton tavern	2	
--------------------------	---	--

Oaston tavern	5	
---------------	---	--

28

Big Benton Cr (brick bridge)	3	
------------------------------	---	--

Inky River Bentonville	3	
------------------------	---	--

Chesapeake	3	
------------	---	--

Little Benton Tavern	3	
----------------------	---	--

East branch Benton tavern	2	
---------------------------	---	--

South frankfort	4	
-----------------	---	--

Randy R. Frankfort	12	
--------------------	----	--

Glen's Creek

Venice

Young

• 10

1

3

2

2

1

Shannon's Run

South Elkhorn small

Seymours fine fern

W. G. (1937) 21

which was about 6 ft. high. The tree
was leaning 30° to the right.
The upper stem was bent back, cut
down into a branch, & the lower
branch had been broken. This was
done so that the wind could not
blow the tree down.

The vegetation is fairly regular throughout
the area, though no distinct community
features could be found. The vegetation
is composed of grasses, sedges, and
herbs, with a few scattered shrubs and
small trees. The soil is a light brown color
and appears to be well-drained. The
climate is temperate, with moderate
rainfall and temperatures ranging from
about 50°F to 80°F.

Open gentle face

(Aug 1) Windy, cool and overcast
(Aug 2) Windy, cool and cloudy with
a gentle breeze blowing
A long day due to the short days
Winds of over 30 mph.

③ 1. Blau delen werden
2. Rote und gelbe Farben
durchdringen - sehr feucht
und hellgrün

20. *Sigillif. brachypus* (L.) Tournier
S. *brachypus* L.

26
After first walk around
and take some place of the
house for all round
around the lake, and walk
off my walk in the hedge

22 *Cyathea glauca* (L.) Desv. var. *hemicrenata*
glab. lvs p. diam. plane deplan-
tis, undulating with blisters & Sam-
bentes ventricosus.

Limay sur Ag. ellipticus Ohio
23. 1/4 p. brun. ant. clavées courtes
les 2 int. Surtout, queue comp. aig.
limay fasciata

peau lisse. bl.

queue du m. plus grande que la
queue des 2 p. bruns & leu.
clav. long & 1/4 p. blanc. aig. & leu.
toute leu. & l'inf. un peu.

2 p. blanc. t. peu serré. couvert de
petits m. g. de que lèvres minces
à rebord dentell. diffus. tout au
fond mince & étroit, 2 bl. ent.
et tout le m. court au bout. aig. &
2 dents lat.



(2) + 2

Set. obs.

Megarhinus Garadoux Ali by
Spring 1816. Lez. totale de Poisson
adulte du Mus. Set. 20 pouces
long. au qu. bout 2 1/2 p. plus grande
que les 2 prem. long. sorte membran.
serrée au stile. parag. ; g. aux m. de
l'inf. blanc. deux dents. opercule
court & roulé. poignard. venin. étrier
aig. que le style. décalé. tout blanc.


Merid. de Paris 2° 20 Est de Greenwich
longitude 2° 20'.15" ou 9' 21" de l'Est à l'ouest
d'appliquant de latitude qui est 1/300 l'aland.

Metre 1/10 millionème du quart Meridien
Un degré 100.000 m ou 20 lieues de 5000 m.

Souter London 73 St Pauls Church yard ac^{re}
for sale some books in Engl. Scott & Ireland
21. Lutetia min.

Mix 23 p. g. Gr. grande queue du m. et
au bout. pelage noir brun moyen plus
foncé sur lat. et les pieds. p. courts
et 5 doigts moy. angles 2 intern longs
ongles blanc pl courts que les pieds.
nur brun dents blanches can. longues
m. 6. le 2 lat pl grandes toutes pl. trouq.
tache blanche sous les yeux, grande sous
menton et gorge, pet. sur poitrine
99. une sur ventre.

Ali by trawl 2 p 113. found in
the cleat of for a fine fish and
8 inches long perfectly white, with
the head & neck of a fine rope colour
belly swelled.



1. N. g. *Eurytoma terebrides*
Ent. brun olive branche plane ou ali
Margines, Cog. tenuicili, à un corne
ou longitud. Animal sans tent. à 2 year

26. Decembre

2. N. Gaff *Patella Notrema patelloides*
Cog. ronde dessous à oper. later. s'atta-
chant aux pierres, face. brun olive
à sill. circ. et rays. diag. sur Cog.
Operculi tem. rond brun visant ~~au~~
de relevant latéral levant sortir
un point à 2 year.

• Patelle - ronde à 2 rays en trans
vers. sur les ailes
• Petit Guiller à tête et ventre
jaune, dos. brun - ailes bleu à 2
raye orange. sp. p. L. cyaneopurp.
• Sauteuse (sp. Jammat. Du,
à pet lignes transv. brunes, yeux
brun vifs. Ailes brun vif - pieds jaune
pâle à gon. vif, et pieds orange
L. erythrophus.

Pike travels 1810

Up Mississippi 1815. C. St. Louis
to the source
Fisher Catfish, Perch

- 32 Boreas Quadrup. nov.
- 33 Large black fox / Rennard Dargent p. 52.
- 34 Beautiful fox red back, white tail & breast
Raccoon Skunk - Otter, Mink Elk Deer
Lynx argenteus
- 35 Panther gl. Claw-horn. Prickly ash
- 36 Savanna partridge p. 72 Head white
nearly black red mark over the eye

1816. Up Osage & Arkansas
Osage. Front & back striped 12 inch
Captive Panther. Elk Deer

Prairie Squirrels or Wistomiship 156
Arkansas yellow & black rattlesnake
Land Turtle, horn frog or Camomillion
in the same holes. Village burrow of a
hill near water holes spiral ^{partly} deep
Dark brown belly white, tart teeth
head nails of squirrels - Vill 2 or 3 with
square holes to put apart base of grass
around near. Small vine Wistomish
difficult to kill, will run & in meat
pretty good after expos. to frost a little
rank otherwise - Police of Village

Autumn 1818.

Wild horses bay black gray & all
colours

Buffalo. 3000 only cows & calves

Bearian (Blairian?) the peak 18000 ft
Yellow & Pitch Pine Mountainous mts.
Woods of Cottonwood River

Wild Cat Head of Red Rock
Hare Cedar New Deer

New Bird - Green tip. of a quail
with a small tuft on the head like a
pheasant, carnivorous eat meat 178
kept in a cage, killed on another Mt

Adams narrative

Coopers of Tombstone Lynx
Redish brown above, grey under
neath, crest of ear, short tail -

Quail New Migrator
Deer Elk. Wild huf. Buffalo. Bear
Cabin

Pecan, Ash, Hickory
Upper Mississipi
Oak Pecan Chestnut Black Walnut Sugar-mn
Cedar Hackberry buttonwood Sweet Oak
Lynn, White & Red Pine Sap-pine
Timber Aspen Hemlock

Leverett's froglets -

Red flycatcher with a tuft on the
head and 2 long feathers on the tail
in the male in the breeding season

Amur Cricet. entirely dark brown
Minnow Caterpillar band velvet black
on green ground - butterfly white with
a few brown stripes & spots

Copper leaf golden yellow, 5 feet. 9 in.
across - with thin hair bent forward

Elephant	Dutch Elephant	Hottentot Gouap
Rhinoc.	Rensster	Nabap
Hippop	Zee koe	Kavus
Goraffe	Karmel paard	Ka-ijp
Buffaloo	Buffle	Ka-oo-p
Panar	Gemsboek	Kaip
Pecche	Goudre	London or Goup
Bubale	Hartibast	Kamap
Zebra	Wilde paard	Kewap
Guaya	Guaya (Wilde) Get	Nor-kunap
Hare	Haaze	Ou-amp
Mammot	Tas	Ka-vutup
Wildboar	Weldwarker	Kou-goup
Ant bear	Erd-Warker	Gouf
Prompine	Yer Warker	Nen ap
Zey dog, Hound (Houter)	Hound	Harip Harim
Rat	Rott	Dowrup
Boat	Vleer May.	Nugya burup
Lion	Lew	Gamma
Tiger	Tyger	Gann gamma
Tiger cat	Tyger kat	Ou-amp
Hyena	Wolf	Hirap
Wild dog	Weldhond	Goup
Jackal	Jackal	Dimp
Hurf	Paard	Aap
Bull	Berlt.	Kiermap

Cow	Ox	Goat	Goat	Goumas
	Oii			Goumap
	Sheep	Schaps	Goat	Goat
	Goat	Brock	Bri-i	
	Chegat	Gyot	Tarane boif-	
				Reebok
				Grievp
				Drykler
				A vump
				Steen boek
				Harip
				Goum Goum Goum

Birds & Caffe

Marmet in Holl. 12 to 15 in hind leg
horn make their smooth, mouse grey
with a reddish tint on the sides of the
back. belly & insides thin white
sim like a hair, in bushes, cry as
Warbling long & shrill & singular
very good to eat.

Bluet tayer or Monkbird. Gragaga ga
Sige blackbird - golden green with a reflect
of purple tail lanceol. spotted profuse as
the wings, bill hooked long and on the feet
climbs feed on insects not a Pieris

Blackbird with orange when belly
got me worn

Ape with black face, an idle size
hair pretty long of a greenish tint, belly
white - face black, mouth all over black
on the organs of generation cheeks with
a black line. On twigs in woods -
help the wounded birds therefore
near River Klenivif

29 *Tilia parviflora* Raf. T. cornuta Dr.
Ch. Des. Trans. morphol. Soc. of N.Y.
p 446 June

Glomerina pusilla var. ^{decaudata} ~~procera~~ racemoso-
folia ^{strobilifer} fol. opp. patulis connatis carnosis oblong
subulate florib. axill. foli. lipp. cat 4 ft. Pet 4
capit 4 patipermin. ⁸ fibro articulat. folios.

Linnella brachistima. Revers. fol.
radic. filiformis cylindricis obtusis, divisa
spica tuberculatis, flexuosis irregularibus.
Scapis fol. dimidiis breviori cusp. cat 3-5 ft.
C. tubo inflato 4-5 fido. equati - Capit. reflexis
minutis! - 8. L. terminali 2 or 3 ft 1441 June
fol. apic. Hirsutissimis & otherious within
the range of the tide. together with *Tilia*
In Sept. 1 cm. ft. 4 ft. 3 Stam. pet subdepressa
(Crypsitum) staminei larger

2. unaples cont.
by Dr. J. C. Gray




pet 6 ft. very short, just on time

30 *Draecna borealis* Andr Rep pl. 206
Rac. ripens abb. ramos. (travelling shooting
cysts), ramii flexuosi
fr. down bl not cil. 4 fol. subundatis
Scape flexuoso multo. ft. 3 subtus 4 sup.
Stigma oblique trunc. conic. dilat. obl.
bucca cornuta ^{g. w.} im. ellipt. or wider

I stand on marshy a Draecna in old broken
1. p 454 Nutt. 1776. by Dr Kennedy Montreal
9 ft. 7 petals, Or. obl. 2 in.


Le meillors livre à faire connaît-on à
un jeune homme qui n'aurait devant le
Confessionnaire d'un philosophe qui aurait
vécu dans le monde, et disant tout ce qu'il
avait, tout ce qu'il a éprouvé. toutes les fautes
et les erreurs qu'il a commises, comme
l'il était devant le tribunal de Dieu;
mais un tel livre est encore à faire
Similia Nommé de Montolieu




11 " Sipula? Gnats figure Ohio
long 1 1/2 in. ent. wnp. ailes
gaufrées. Côte sales

12 Ephydium unicorn? White fly
Evansville 5 o'clock Ent. blanc corps
rouge avec brun, grand' patt.

13 Formicidae Henderson. F. antennata
Brun depuis l'oreille inf. pieds &
ant. avec rouges 1 1/2 long. tête et ab 3
ov. vélus corps lisse. Nid
lur pelous 1 piec elevé 3 pouces rug
à plus ou moins



14 Abd. fauve rouge & lache mire
F. rotata. Cpt noir jambes rouges



15 Culicoides fuscus Ohio
long nat env 3 à 4 l. ent. brun
rouge. Ant. 1/2 noir pieds rouges
16 Musca Varipes Sweet Sucker
Gr. nat. yeux gris brun rouge thorax
brun, ab plat peu à à demi ren
des paires d'yeux allongé plus grandes
Ouvertures diagonales



American Monthly Magaz
Knowles
Terry
Parrot
L. Collins.
Rev. Harris.
Stephen Elliott
Ch. Whittier 1/2

Dr. Sullif
of Bedford

Low mt

Bd


Curator

Flora Ludoviciana

Dr. Bigelow 5 Copies
Dr Gibbons 1 Copy
Steph. Elliott 1
Harmony 1
Lyceum 11. Tuckerman 3 copies

Steph. Elliott Chart - April	
20 plants.	Horticultural New England
12 ap. 1st week \$12.	2 Jrs. May 10
2 Jrs. 1st week 50	2. Cor N. G. + 2
2. Pa. four Somew th 80	2. The Somew th 80
2 Nat. Sci. 25 "	2 Nat. Sci. 25 "
<hr/>	<hr/>
\$ 29.50	\$ 27.10
<hr/>	<hr/>
8 J. 8	35.10

Salmo ~~oreades~~
montanus



Mount South Mountains - 8 p.

Tête oblongue à reflets violâtres. Iris brune.
Dorsale brune, taches rondes plus ou moins étendues
sur les points et rayures d'entre elles et dessous la
ligne latérale. Dors. II ray. rayee. I. brune
Anale 10 avec 2 post. blanches, une ligne
de canaux rouge portant nase aussi. Nez
nug. petit rouge. Branches de ligne brunes
nug abd. 4 d.

Quatre ray. à reflets bruns nug. rouge
Une barre plus pale sous la dessous à
points rouge plus petits, les taches
jaunes plus nombreuses. Nug. plus forte que
nug. bruns. - Poisson femelle
Aploctidae S.

ii. *Aphelinus* *Graells* *montanus* S. connat

Habitudes. Antennes 1/3 long. app. aux
yeux. Flèches à n. gr. 1/3 long.
Corps très rugueux aussi.

7 May Thursday	1818 -
Villedieu to Long Valley	20 m-
Dominion Town Chaudiere.	11
See back of Chaudiere Div. water	6
Varied Fish	17
Abbotsford & Takaway Cr.	1
Granite	6
Uncertain	1
2 M. Trident	<u>62</u>
Brilliant	6
Little Conestoga	2
Menfield Hamlet Gorge	4
Glenburn	4
Bridge Sing. 100 ft 1 m	1
Wrightsville	1
Cross Creek Valley	
River Limerick	10
York Cadom	1
9. S. 19 m	26
York to Abbotsford	15
Limestone Brecchia Gr. & Shist	
Oxford	4
(green hill)	19

10 am

Cowenago Cr	- - - - -	1
B		
Fork to Gallytown	1	
Huntertown	3	
Munertown	6	
Marsh Cr & mill	2	
New Garden or Helltown	3	
French mt ^s mill		
Marsh Cr. & etc.		
Town	4	
11 Monday	17 1/2	

Turnpike of Gettysburg	1	
Canocochege Valley	2	
foot Mt. Cheesetridge	4	
Greene village	1	
Talline Spring	5	
Chimneyburg	2	
Cowenochige	15	

12 Tuesday

Mecklenburg, beyond Creek		
Brack Creek	4	
Campbell's town 40 h	3	
Campbell run & hill	1/2	
Limestone		
North Mount Little Valley		
Patt hill. Bath Valley		
West Cnne. ridge		
3rd Lincoln foot Cove Mt	6 1/2	
foot east London south	12	

13 Wednesday

Cnne. Mountain	1	
2d of G. - town (Fireballs	3	
etc. etc.	2	
McConnelltown Cov. Valley 30 h	2	
Little Scrub Ridge	1	
Great Scrub Ridge	2	
Gallerton run	2	
Kicking creek & 1000 ft 12 h	2	
foot Shaking Hill	3	
Top do	2	

20

14 February

To fort Golgotha

Henry's Inn bridge

Bloody Run 12k

Infantry M & Gap

Snake Spring

Demarest's Gap

Devonian

from bath

Bedford

Mammoth Swamp 0k

15 Fr.

Clarkesburg & Conococheague

bridge m2

Well 1st left

Long Hill

Potteriburg

Branch creek

Fort Alleghany

16 S

To 6th Allegh

Tolton Tavern

4

3

5

1

4

1

1

2

20

2

2

3

2

3

14

3

3

6

17 D. Rain -

12 M^y

To Hollie D. Johnson

Stone Creek

Hamilton 20k

Laurel Hill 19 1/2

To Limestone Creek 12k

Stevens brick house

Laurel Hill 20k

Laurel Hill 7 miles

23 W

To fort Laurel Hill 1

7th (Johnson) 3

Laughlin 20k 4

Cold & Town Mc Jummar 2

21 Fr.

Brock Mills 12k

To Ligonier or Renwaytown 3

Well Creek 1/2

Gospel river 1/2

Lyalltown 12k 2

no fort gate 3 1/2

22 F

Yo Soake ran
to Johnson & Livingston forge
Youngstown Chest Hodge 1^{1/2}
Whittemore Tavern 4

23 S.

Granville (lumpkin) 6
Tilley's 201 5^{1/2} 6
Limehouse 12


24 S

Yo Juvine 3
Yo Little creek 12
Gaff 15

25 M

Yo Williamsburg 4
3rd East Liberty 1
Youngsville Lawrenceburg 5
Youngstown 1
Williamsburg 11


Ich. Oh. 42



Shad - N. G. Amphiodon, Jiff Glopp
dorsal 9 Mach dent. emp., Clap. br. 1/2
pas long. d. abd 7 ray. app. Cuvier &
Long. 14 p. diam 3^{1/2} ou 1/4 total
caillles gr. m. Caudales arrt arg'
emp. bleuatre dor' despus, bleuetee
sur les caillles, Septes oblate
doré. Mach. inf plus longue et étroite
Dents grosses coniques aiguës. Sur
les 2 mach et la languette, Dor'
arg. doré, lignes lat. app. courbe en
bar. Queue égale bleu bruni, base
rougeâtre. Ray. doré et dor. arg. bleu
Amphiodon. alvocides

app. de la May. abd. glony aiguë
plat, aiguë.

Tch. Ok. 56?



Corp 17 pied Catostomus macrostomus
Dessus tête olive, dessous blanc dos
olivâtre, dessous pale. Mag br. olivâtres
peau olive abdomen bleuté, gris.
Shippingport 14 juil. 1813 égale hauteur




Musca mississippi Eye's d'écrou
Henderson long 21. noir, nez
jaune yeux bleu oïles intenses
Goues les deux t. jette sur le yeux



Blanc à Volee de Anneau
haut 5 pouces dessous tache de
gris sur la volee.

Tch. Ok. 55



12 N. G. Amble abond
diff Cat. dentés oblong
Mag nivatres

petit brunne & ventre blancs. Pas barbes

Iris bruns. Ligne dorée grande. Tête

Tete des Catostomus. Grise abond



Catostomus amble abond
Black Bullhead. Horned jaw
lèvres noir. Pêche gris, m. aux lèvres
en forme de un boudin. Epineux
50 et 97 g. pondant le 0, oltre Mach

Dimanche 30 juillet
Le myrd Jasse

Black Bull

Picassata. Poissons étranges

Mimulus


Ich.Oh.46.



24

Mimy - *Hydrocypris clinema*

Argente' dor. olivaceo. Cuvierage
brune le long du dos, depuis la tête
telle tige d'or brillant à reflets roses
dans les yeux vers l'arrestation de
l'ir. arg. Lignatifs à ligne verte dans
int. operc. raye oblique May - eray
bande sombre sur la queue. Gouffre
Opere. double, membre 3 rayons.
2 lignatifs courts plus courts que les



24

Ich.Oh.47




24

Chub

Tiff. des po. pas tache noire
à Habaf. de la queue doré doré
depuis la tête brune, forme des
lips, longe bande brune
lignat - bleue bleuante

Hydr. notata


Mimulus notatus



O

99/2

annexe
très épaisse



Elliptique
auj. f.
épaisse
mollie

N.G. ou *Griomyx Ohiensis*

Carapace sans écailles molles elliptique sup. à centre unif. convexe. des et des pointes part des points enfoncés ent. olivacé rosâtre de rouge, petite tache rouge. Crev. et cartilage molles ciliées, dessous du carapace corps ent. blanc Crev. et gr. gris
en tache bleuante, depuis tête et membre olivacé peu rosâtre. de la queue 4 paires, yeux petits pieds portant 6 doigts dont les 3 ant ont des ongles, les autres sont doux.

Tubifex (000)
 Tr. cyl. in gauze capsule
 diaphragm - depurin 69
 Tubifex plain, 5 Gym.
 depurin purant by tr. antisept.
 68



Moraria elongata Mad. Siphonocyst.

69 Moraria flexuosa
 undulat brach. grande
 infundib. thin. venus
 68. ciliates

Madr. Iris articulat
 art plat circ. thin. array
 brach lat. thin, relev.
 laterale rotatice
 Marges granulat.
 Iris nana. artic. minima
 marges bouches termin

68 Articulat à bouch + lèvre
 au mil de l'extre. abduc
 maxillaire et maxillaire

69 Madr. Iris articulat
 Iris dentat à la tête
 exter. Ciliates.



Depuis le Louisville
 falls de Henry
 M. Martine
 6. le Nomadales.


70 Tubifex cyl. rugosa agg.
 par des appent. communs.

71 Madr. specie blane 1/2
 fil. flexuosa ciliata -
 Moraria flexuosa


72 Bois noir petifi.
 Blé blan. cristal. avec cire.
 Varieg. liber de

Moraria testacea
 73 Madr. rug. rug. brise
 crust. epiphyt. à pomme

74 T. maculari Clippin
 Turbo 3 pines,
 lèvre fine relev.
 cilium levigat.



Turb. grosses cotes, mélange
 en silice - roxy



78 *Murif.* cyathicole
Court. en bouteille phrygien
rugueux et rug. hyal. Isth.
longitud. Marginal oblique
et 81. 6 mm. de

79 *Tubif.* compact perio'cle
tron cylindrique aplati dans
int. sans diaphragme

80 *Tubif.* tronc artic'
plat rugueux depuis la
base jusqu'à trois quarts du
tronc à l'autre extrémité

81 *Tubif.* artic. fl. - que longe.
Angule 5. Gouge profond
litt.

82 Cy. 3 angul. angle obs.
impétui. Valv. ext. plu.
grande. angle large

83 *Murif.* nouve
très ext. au pu
gramme. branche
baptie

84 *Millepora* - nov' puer oblongs

Tubif. tron à cloison
très courtes 85

86 *Tubif.* 86. *Goniopora*




87 *Murif.* Muriciforme très petrifi'
Stipeus droit. corn. d'arm. cassé
dichir. chrysine pointille. Murice





Deltif. obt. nupif. tub.
Sur les éponges pétale pour-yeux
Surface tuberculée



N.G. de Gervais
Cerithide
nudicaps. incy
pol. 4 forme



Cladostoma flexuosa
Macrastera rugata R

Avant le cyl. Il possède des
ray. transversal. un peu granulé
flexueux. leg. - ram. très court
simples. à la branche rameuse
autre action circulairement

Streptosolenia
Nord. Lat. Amer. du
Nord. Cela branche en deux
étoiles. long. 10 cm.

Vers de l'Ohio

93 *Exochelina obtusa*


Exochelina


obtus. tél. minces du corps à centre
roux dans les articulations tête
et g. non articulées ni nupt. Long 21


G. N.G. *Diplostomum oblongum*
Derm. avec prét.

Sur les pierres & le Poecilostomum
repous son l'au rampant

Long 21. int. aux obtus, à gg. artic.
et pieds. non articulés, tête. et qua
bifide, à 2 pet. tentacules





94 Falls Ohio

Spongophorus lobula

Cutt. ventrale. Corse à 2 profon
sillons aux 2e 3e 4e 5e & 6me trichin
compris la queue, des gros tuberc
avant le 7me comp. 000 ⑩ mm l

Tribolites elongata





+ 15 I.O.p. 22


Rockfish *Perna elongata*

Lung. 10 p. Siam 3 cornu pime
bouchie gr. à dents ext. petites 3 ope
ocul. - 2 dent. 3 à 1 ch. pect.

vent. clavos - Lut. arg. à 99
pet. liger. bruis. long. 1/2
le ch. 1/2 n. vent. la ligne latitud.

Dors. tête brune, yeux gris.
nig. iris dor. 1st larm. brune
à 3 ray. Nas. an. 2° oblique 2
à bat. ocelli.

1 Nas. dor. 8 ray. op. nary. rous
2° brune pect. 1 ray. op.
anab. brune pect. 3 ray. op.
Thorac. incisus. 1 ray. op.
Zueu. op. ext. brune

*Clupea ambloplites* Raf. & Sauvage

Gillard Shad - Hickory Shad

Lung. 1 à 2 p. Siam ant 1/5 de
long. totale. Lut. argente à cl.
imp. bl. ant. une grande tache
brune. Dors. cap. de ligne latitud.
Bouchie obt. much sup. pt. brune
Carrapate sans dents longue brune
Siam dor. 1st grand (n. arg.)
brune. centre noir, 2eme. incis.
lob. vent. plus long. Ventre rosé
Lentille petite - Dors. de la
tête à 2 taches obt. verd d'incis.
99f. 1 pris de long

Clupea crenata s. lancolat.
N.G. Dorosoma notata

100 *Yperstilio* ^{*Hypexodon*} *Denticulus mytilax*

Long total 5 pines dont 2.2
Lévres 14 p.

Dents, 3 ou 4 sup. molar. inf 6
Serris emarginés trois petites, les
4 canines tronquées, molaires
irreg. aiguës, 2 tuberc. sur venues
blanchis à la base ext des canines
sup. - Pelage du corps entièrement
blanc avec une allonge et à
l'angle fait, queue rousse
Oreilles longues obt elliptiques
avec nerf transversal interne.
Cervicale oblong et un peu obtuse.
Oreille brune, dessus tête brune
tache grande, mache rose inf
et sup. narines rondes et appréciables
Moustaches appréciables

101 Var d'Astacus vell. sp. ^{A. Vigidae}
Mouvement pl. gr. 3 fois plus, moins
et corps pointé par points enfoncés
vernuqués entre. Dents à dents obtuses
irreg. Poignard à 2 lèvres dépourvues de
dents int. 3 pines de pattes chelif.


102 *Astacus* ^{*Occidentalis*}

Crayfish of Ohio. 2 à 3 pines de
la g. post. lat. fait des mouds
vernuqués percés de

4 pines de pattes principales la
1^e chelif. irreg. la dure plus grosse
main oblongue déprimée sans epine
doigts allongés à 2 lig. lâches, un peu
enclous au bout par membranes int.
poignard à 2 epines, 1 de chaque
côte, bras à 1 sp. dessus et dessous
pied du poignard

Bec court presque plus que le pied
des ant. concave à 1 sp. de chaque
côte, 1 epine dessus chaque côte
Corps un peu granuleux
Ont poignard très grande Corp.
Jambes avec étoiles pilosité.
2 lèvres lâches ext. en avant et
frangé.

Couleur olive olivâtre brune
lèvres rouges et jaunes Racoon
Excellent appr pour poisson
Surt. Corp. nég. pl. couverte que le
x Corp., Corp. ext. verdâtre olivâtre
1 epine à ch. épingle ou sommet des Corp.
dibit. pas au filon flexueux dilaté




Bodianus callium R. Basp.
1. bras plus aiguës, olivâtre-vert
d'assez à 99 fauves et 10 tirs
vertâtres, Dents. aiguës mais pas
plus longues, dents oblates
régulières, iris brun clair, opercules
triple consistant, à 1 épine obtuse
3. sur l'appendice aigu


Nas. olivâtre à dorsale à 23 ray
dont 9 ep. Anals à 12 dont 1 ep.

Zuue bleu à 1 taie brune
à sa base inférieure et dans la queue
en croissant suivie d'une barre
jaune violacé pale, entre les deux
lignes latérales courbées en huit
la queue est uniforme et régulière


256
Un peu gris, Astuce, Gray fish
à mains égales sauf 1 grande corps
de 12 mains par échelle. doigts nus
échappent longs et très flexibles
plus longs que la largeur de la main



Leporin 12 16 3-9-12
Sparus cyanolepis - Sunfish
Vert. olivâtre clair, parsemé de points
bleus irrég. qui sont parfois tout
blesuets. dos bruni, tête brune
dorsale, poitrine à lignes bleu fléchis
dans clair, 1 poche facile oblique
à l'opercule, point d'écailles
Épine arquée. iris orange olive
peau bleuâtre, Nas. thorac. bleuâtre
Ventre pale bleuâtre



H. G. amphitrite
Otolithes
Siphonophorus
opercularis
Long. 3/4 pouce grisâtre
av. une bouche, Sept. ayant un opercule
renif mobile membre. 1 trou, tout fermé
degr. de table agglomérés. Crâne. Corps
plat avec à la tête plate ronde noire rebouché
Ant. à une lyre circul. Corp. oblique à apprend
lat. et oblongs obt. Lèvres oblique




+ *Boulengerochromis* sp. *Sciaenoides*
2 à 8 poches pr. Cylind.

Mâche sup. plus longue obt. pet. dents
operc. double à 1 mm. Ferme.
le 2^e aigu à 1 spine ferm. Gray
branch - Détour de la tête
roux, vêtements argentés

Couleur. Blancs rayés trans-
versal de brun clair, env. 20
rayes alternativement grandes et
petites, 1 point noir à l'abîme
de la queue. Noy. hyalines
1 raye aiguë sur la queue
brunatre

Yeux saillants min. Iri arg.
1 Ray. doré. toute epine
Anale à 3 ray. op. 10 mm. de
l'écailler nudit. env.


Poisson buntte
Perch-fish



Cyprinus sp. *Hydrargyrus*
amblops. *Ctenophorus obtus*
White Club 1 à 3 poches
Cyl. blancs ou un peu grisâtre
Détour de la tête roux, Iris arg.
Nageoire latér. noire, une larg. band.
arg. détour ou plutôt opaque
grande. Lézilles.

aff. *Hydrarg. notatus*

<i>Sparus & Labrus</i>	- 1 Ray. dor. op. o.
<i>Diptero</i>	- 2 D. - D.
<i>Lutianus</i>	1 N. d. op. fer.
<i>Holocentrus</i>	1 N. d. op. ep
<i>Bodianus</i>	1 N. d. op. ep & fer.
<i>Centropristes</i>	2 N. d. op. fer.
<i>Sciaena</i>	2 N. d. op. ep
<i>Perca</i>	2 N. d. op. ep & fer.




Glossodon chrysops s. *heterurus*
Summer Herring

aff. *Glossodon harengoides* Siff.
Plus long et plus étroit que le p.
lary - $2\frac{1}{4}$ ou 1/5 de long. très comp.
Ent. argenté presq. sans reflets
Dorsal décalée vers l'obtusité
nez obt. reculé inf. pt. longue, divis.
don, avec une pr. vnde. Opere -
neu arg. Nez diff. étroit. apres l'a.
nale, queue presq. inf. pt. longue
Anale pt. longue, appens. des abd.
très long adipeux, ligne lat. inf
courte en bas, &c. plus grande
La partie ent. sembl. pas gen. les
mêmes.

Nez. au. dos et caud. leg. opaq.
ou olivâtre

les 2 pr. ray de May 2 et 3 simple
dans le 1^{er}. très court.





Silurus pallidus, White Catfish
aff. *S. punctatus*

Corp. fusiforme compr. pointe, déprimé
ent. de 8 à 10% long., ent.
blanchâtre. Dos et flancs très imp.
olivâtre - 8 barbes presq. br. élatas
très long. mous, les caudales blanches,
mâle, inf. plus courtes, pet. dents
arg. en raie, 2 ray. dorsaux May
dors et post. epineux. Queue
très long. presq. à lobe sup. empêtrée
long. Iris blanc. - Nez. dos et
pet. jaunâtres, abd. blanches
et sp. oliv. termin. de brun, Anale
et caudale brune pale

1. Var. à queue grande blanche
 bordée de noir - 8 May.

2. Var. à 3 barbes noires sous la
caudale V.




+ Testudo Cholorops radiata
Kentucky - Tennessee.

Car. sup. long. 2¹/₂ p. larg. 3¹/₂
lèvre sup. retrou. ant. obtusif. dent. tén.
post. et emarginé, en 2. niv. irrégulière
à 6 rays, 1 canalic. sur 6 c. caillles
later. 3 dech. cat. - 13 gr. 1 c. 10
26 petites conv. sans carapace

Car. inf. long. de 4¹/₂ p. larg.
2¹/₂ p. trou. ant. à 2 dents
recourbées en dessus, échancr. post.
jaune à 1 tache ing. noire sur ch.
plaque. Connexes et dessous des la.
Car. sup. jaune à taches noires

Tête long. un p. niv. ante brune
m. 1/3 de jaune, comme les
membranes, yeux ellipt. verd. à lign.
noire à travers les yeux & quelques
petits points. 5 doigts dont les post.
à 5 d. et 4 onglets dont palmures
excentrées



Ohio River

+ Testudo (nudosa) (S. bigibbosa)


Car. sup. long. 8 p. larg. Ep. lèvre
sup. viol. lat. à 1/2 carapace obt.
à 5 lobes niv. deux extr. des 5 c. caill.
il n'y a que 2 et 3 bientôt
en bas, les autres sont conv. ou plat.

Couleur gris. Olivâtre à racines
plus claires, retrou. ant. dent. tén.
post. blanches ou jaune aussi
flex. obt. dent. bout conv. recourb.
en haut ch. 27 d. à la circonf.
inf. Carap. ant. jaune long 6 p
larg. 3¹/₂ 2 dents sec. ant. 1 ha.
post. 1 sept. tache brune sur car. sup.

Tet. pieds & g. gris déj. jaune
sur fond brun olive et, yeux jaune
jaun jaune, pieds palme à
5 doigts ant. et 5 onglets, 4 onglets
et 2 doigts post.

T. fax & T. picta in Ohio R.

+ 77



Silurus coniceps - Blue Catfish

aff. *S. pallidus* diff' nul pas
Queue orange rouge à la base, ligne
latérale bleuâtre, corps bleuâtre ou
plombé, blanc pale dessous -
Nas. bleuâtres, horizontaux &
abdom. Barbes plus long que *S. pallidus*

Falco Sparrowhawk
long 100. Enverg 23 p.
Bec bleu petit; dent. latt. circinatum
Pic jaune de 3 à 4 mm. poche
compt. Four des yeux jaune
d'or à peau nacrée, tour des
Be. gris et queue blanche, depuis
la partie grise de gris à gris. Dent.
ferugineuse avec un peu de noir
à l'olive blanche. Dc. ferugineuse
avec une tache rougeâtre au milieu des
ailerons de queue. Peau nacrée


tacheté de ferugineuse. bord de
queue à la pointe, 1^{er} ventre & à
la 4^e - Ouvrage, ventre et flancs
blancs à gr. taches brunes bandées
coupe bleue

Queue 5 p. à pointe longue
les ailes, grise, comme le dos,
et diffère aussi en plus clair -

17. Black bird - Oriole

Cou noir à reflets verdâtres
fumelle noirâtre brune

Bec et pieds noirs
Be. longue combe convexe
diff. de 3 à 4 mm. non échancrée
front en queue. Pic de long,
droit. comme aux postérieurs



V. phaiops

Noctilio? phaiostomus
Eptesicus?

+ Envirg. 13 p. Long 4 $\frac{1}{2}$ Jnt la 2.
1 $\frac{1}{2}$ sur le tiers.

Cutt. brun noirâtre en dessus et
plus pale inf. ou rouge brun, Oreilles
jaunes et grises, Ailes et Queue
ent. noirâtre. Oreilles ovales
obt. arrondies, mues un peu ridées
saillantes, yeux gris et cachés
sous et mues peu ou pas noirâtre
Queue une, très saillant par une
pointe de 3 $\frac{1}{2}$.

Ailes mues
jaunes long,
ongles courts
crochus, coups des pieds presque
semblables, doigts égaux et liés
à l'extreme. Section des ailes
et pieds noirâtre dessus, blancs
inf. Dents canines sup.
très grosses - le incis. sup. éloignées
entre elles & à 2. Separées par une
grande venelle plate l'int. simple
l'ext. 6 incis. bilobes minuscules
Incis. inf. très petites très
longues, molaires 3 lob. aig.
tot rouge

Noctilio megalotis -

Envirg. 12 p. Long. 4 p. 2-1 $\frac{1}{2}$

Cutt. gris brun en dessus et gris pale
dessous. Oreilles très gr. 1 forme -
queue très grande aussi -

Hylomys bivittatus -

Long. du corps 4 p. de la jambe post
5 p. envirg. des jambes 1 1/2 p. m.
des unguis blanc. Olécrane brun
vair. de taches. Yeux noirs
ongles marbrés. Jambe feuillue
darker; dessous blanchâtre, la racine
ét. des doigts et jambes peuvent être
peu pâle. Yeux clairs.
Ging. ou moustache brune pale vair.
Le blanc, nippé des dessous des corps
blanchâtre parallèle et tte. vairante
sur taches.

Pieds ant à 4 doigts libres, les
post à 5 palmés, tous à peau oblique
en avant et en arrière en dessous des
articul. des doigts en tibias ventraux.

120
Cucumis L. *Moraceæ* - *Louisiana*
S. N. G. Erythrosperma *cupidata*.
Balsam apple Cult Kentucky for
Wounds, fiery fruit in infus. in prints
epicr., excellent

Glabra, *muñica*, scandens ramosa.
Scand. gracile angust. subtriangularis foliis
alt. petiolis fol. equalib. connatice collectis
subcomplicatis fol. laevibus parvis
lauri subtriangularibus palmatis foliis
subtriangularibus palmatis foliis
lauri subtriangularibus palmatis foliis
lauri subtriangularibus palmatis foliis

foliis oppositis. foliis simplicibus
fusca apet. foliis
pedunc. trifoliatus
foliis trifoliatus pallide luteis de venis long
extegit, pubescenti, maculati.
bracteolatis dentata, luteis
dissimil. subapice
pedunc. Cut sparsa.
foliis. or. atis circumvolutis luteis.
longitudine non usque.

Convolvulaceæ *Spartilia* *Fructus ovatus*
petalis obsoletis inter. meq. long. verrucosop
nugis extre. rami. nervis 3 indep. pulps
apice undulato orofis 3 locul. inter
Ran. 5. diadiplos inter. per abscissionem llo.
adip. glaucesc. convexa mucilag. involucrum
alt. Anther. testiculisstellatis ellipticis rugosop
tubulis truncatis flex. nivis, marginis
cum fil. obtusis 3 gono. 3 anthers. flex. nivis, marginis
cum fil. obtusis 3 gono. exornata trans-

122 *Coluber fulviventris* - *Chicken Snake*
Long. 2 3/4 pieds - Dent. Jeune 15 mm.
Latt. noir en dessus et rouge de brique
en dessous, à gorge jeune cependant
à grandes tâches noires non ferrug.
Coquille des Dr. Carreras
Environ 200 Ventralis et 70 paires dans
Louisville

Cathartes Snake - Verte à queue
de la tête. Ouvres dans un creux de
Sous

Long de 3 pieds.
Gris à dessous
en liserages
rouges, et qq tache
noire

Dotted snake Gris à pointillés da
ns le dos
me long 1 1/2 pied

Polygonia candal. moll. Nar. Jpn.
Achlyias frayingi *Apenn. Ital.*

125 N. G. Pythagorea - aff. *Platynthus*
& *Krigianus* Jff. Ls. post lat. pappus
palea & 4 staminis. Eclipta
Platynthus campan. deinde foliatus
Spartites inten. 9-10. foliolis lanceolatis
Theromph. convex. pernit. anisotomum, ani-
tis Setaceis - radice suffulta multib.
ligulis feminis linearib. integrifl. obt.
Ovaria legonis, pappus truncatus. San-
vix bident. Flores tubo brevis, limbo
tubul. effuso. 4 teeth. nigris involuis
Fruct. Sem. nigris granulatis legonis
rhomboidalit. Pappus exfoliis in-
tegri truncatus.

Pythagorea ramulosa
Cauli ramoso rameo aspero
hispida, fol. opp. sessil. lvs. acutis
remote subopposita aspera hispida
fl. axill. opp. pedunc. fol. basiviril.
lvs. perianth. lance. ellipticis, ligulis
non subequalibus. Louisville Sept.

P. pectata divaricata Ovule fib.
caul. alboroso, fl. albi paucis, stylis
latis. Anth. nigris minimis.

Interv. foliol. perianth. interjectis
minoribus interiorib. fol. nigris opp.
ramosif.

126 Agnites prolifera N. P. Shipp. Sept.
Caulab. capituli geniculatis testaceis
ramosis levigatis, fol. linearis-lanceol.
(l. latimarginata) lvs. vix retrorsum, ligulis
brevis terminalis, vaginis ff. hispanicis
axillab. terminalibus oblongis exor-
ditis, fl. exfol., puberulatisque
valvis glomeris subequalibus lanceol. cuspi-
dati, coriaceis. Pedicellis sublongiorib.
valvis subequalibus lance. acutis lvs. multo
arcuatis involutis.

127 Louisville A cultissima forma
in N. G. *Stibauxurus*

Brs. nigris petiolaris. Pinnant. distri-
bu. gen. connexa angustata. Curve large
convexe obtus, narinis ill. diagon. mes-
dans unu membro. Pieds densis, denso
de plumes aux distans des genoux, le droit,
peste, epau. pieds bleu plumbi onglets am-
ples à la partie égale, cuspido. nigr.
non furulosa.

Long. 5 ft. Queue 1 ft. Enverg 22 ft
Dont le Corps brun, Grise et pectoral
qui bruns bruns - aile. bruns rosâtes

Made 13 Oct. 1911 at Lexington
 C. H. & G. Co. -
 Bear Creek Crayfish, 1000
 Wasp 200
 + Gravelly River C. Sandhill 2 boxes 1
 Meadow Creek 175 boxes 3
 Do. - Second Box, 1000 boxes 2
 Do. - Third Box, 1000 boxes 3
 Parched land, 1000 boxes 2
 Mountain River, 1000 boxes 18
 150.
 High Creek, 1000 boxes 8
 Meadow Creek, 1000 boxes
 Beech Creek, 1000 boxes
 Branch Creek 6
 Blue Creek, 1000 boxes 5
 Blackwater Creek, 1000 boxes 9
 61 200 boxes, 1000 boxes
 150.
 Herring River, 1000 boxes 2
 Bear Creek, 1000 boxes 1
 Beech Creek, 1000 boxes 7
 English Creek 4
 22

16 Oct. 1911 at
 Bear Creek, 1000 boxes 1
 a
 17 Oct. Sat.
 Bear Creek (Hartman) 1000 boxes 11
 Meadow Creek, 1000 boxes 2
 Fish Creek, Taylor Creek
 Log Creek (2400 boxes) 2
 Bear Creek, 1000 boxes 2
 18 Oct. Sun.
 Beech Creek, 1000 boxes 2
 Beech Creek, 1000 boxes 1200
 Bear Creek, 1000 boxes 5
 English Creek, 1000 boxes 1
 Beech Creek, 1000 boxes 2
 19 Oct. Mon.
 1800 boxes
 Bear Creek, 1000 boxes 1200
 English Creek, 1000 boxes 1
 20 Oct. Tues.
 Bear Creek, 1000 boxes 1200
 English Creek, 1000 boxes 1
 21 Oct. Wed.
 Bear Creek, 1000 boxes 1200
 English Creek, 1000 boxes 1
 22

1920-21

Boulders, 30 ft. in back valley	12
Caves & fissures (traversed)	2
True mouth, 26 ft. + another	1
True Creek (traversed)	4
of bottom 20 ft. low at base	6
Ridge of rock bed broken	6
With base of the cliff	1
Total	34

200 Old Franklin

Missouri River	6
Colorado River	1
Snake River	1
Yellowstone River	1
2nd cut Colorado River	1
Pecos River, New Mexico	3/4
North Cheyenne River	1
Colorado River	1

Congressional Record

On Oct 19th 1906 the following
birds were seen at the
C. River near Chico, Calif.

2000-01-01

G. & G. (G. & G.)

22 Oct. 1911.

1-26
1-26

54. *Omphaliina fasciata* R. O. Dr. Vn
aff. *O. undulifrons*
long 7 long C. haut 4 1/2
4 spines distin. blanch
et lisse à bord enroulé à 1 bord jaune
distin. con. fauve pale tri. jaune
lisse. Ombilic grande et profond, bouch
diagonale large.

Fusivale.


52. *Leptoxis lobularis*

Lymnaea auricula
Blanche entière la face to
uir, lisse à 3 fines plaques
ferm. oubl. bouch. orale base à canel
spars report. Colonne tendue.

53. *Lymnaea lucida* - gmelin.
Ent. olive brillaire à 4 spines
base aigre. La partie clair tour
tre grêle, bouch. ob. base aigre
Colonne tendue

54. *Lymnaea croppula*, gmelin.

Or brun leg. spines ob. ellipt
4 spines emp. oblique. Bouches
allongées à base aigre. Sommet
obtus triangulaire. Colonne tendue
flexueuse à base rabattue en
nappe.



55. *Lymnaea gonostia*.

Rougeâtre lisse à 9 spines
les 3 sur le devant en queue per
bouch. oblongue. Colonne
tendue à base rabattue

56. *Omphaliix strobilos* Temm.

long 7 1/8
Large 6 1/8
haut 4 1/8

Leve réfléchie noir laissant ind.
couvert en partie lèvante, Roug.
diaphane, mais noir de la pe. tache
noire et grise apparaissent par le lèvre
qui partent à trou, 5 spine tri
ang. aigre, empes coups distins
dernier tour très bombé et curvée.

57. *Lymnaea dilatata* Gmelin
long 7 1/8
Large 6 1/8
haut 4 1/8

58.


1008 Bobbin Blk. Infly
Bargut, off. for place, after, from, oblong
St. John long, narrow winged chickw.

Argus Agas. Ch. 122


Rock Hand spines fr. 10 m.
W. Bay white. Up white. 1 gal.
Size. 10.5. Intensity. 1. W. gal.
Up, lower down. 2 long. Convex.

Dipodon 137


138 Red Vulture 15 m
W. Bay 3
Up white. Condition 15 long
Size. 10.5. Intensity. 8 m. low
139 White Vulture 10 m. Point
Up white. By 4 corners
140 Mangrove 10 m. short
Up white. Brand wine
141 Chita hawk 10 m. light











N.G. Directus truncatus 118 Ich.Ohi: 82




long. 2 p. Brun foncé depuis le bas blanc
cinq écailles, peau coriace épaisse. 2 Ray.
dans 3 rangs d'écailler. July 3 lines int.



Ich.Ohi: 81.
acc. macrourus?

N.G. Stegastes
steindachneri

long 4 p. dessus brun foncé, flancs blancs
7 ou 8 écailles l'opercule flay. abd.
nulles, cinq qui au place.



Dwarf fish
diamond fish


Jack fish N.G. Litholepis (Gouttelettes)
coule de l'oreille
Méjean large coriace depuis le bout à
anglais centrale noir converti d'
épines jaunes peu profondes & lâche
Gouttelettes lourdes 200 g
peigne noir horace non entier

116

Ich.Ohi: 54.




Catfish Buffalo. - Catoctomus anisopterus
Ent. Org. 1 p. long. 15 cm Nag dor
10 pouces. Duke Buffalo
Henderson Printemps. June



Ich.Ohi: 70.

Jack Cox vittatus. 115

Long. de 3 à 5 pds. - Commun dans
le Wabash, & upp Mississippi, rive
droite Ohi. Poisson des Canards
Muf. obt. à gr. dentes, vent grand
Dor. bruni, flanc noir à 2 bandes
longitud. nivatrices.



Tekt. oh. 17

Glaucosoma
luminescens

Mud Sucker - *Glaucosoma*? *luminescens*
G. diff. Silurus 2 May. dorsal
Cuirass plat ent. bruns sombre
et marbré de rouge - jaune blau
principale de tête rougeâtre
en dessous, apparaissant de l'apex
yeux sur la tête aff. Utricularius
Dor à 2 rangs de rayons lignes brunes
noires - gaff. pure 20 to
bon à manger

108

Aphid Polymniae Niedale a 1889
Rouge framboise pectorale blanche renversé
et poitrine noir. Antennae long du corps
app. noir long. ailes app.
bleuâtre Corp annelé

Coley G. Springfield & Gibson G.
Clark G. Carmi
Union G. Morganville 25 m II
15 Shas

Cypress town at mouth Grand River
Shawnee town
North river falls of Wabash
2 m mouth 15 Carmi
25 m in Big Wabash.

"Gran River . Peride mince odoré
Blanc lames fuligine. 3 long conti-
nue stipe 1/2 de long 12 pouces



Perimacrolete

" Ent' juv nantkin des plus
inf: blanc à pores linéaires
linéaires et oblique thorina?
Diam. 2 à 3 pieds.



Blanc à robe lisse, Stipe 4 ft
des plus épaillers roulé lames
continues 3 long



Blanc lames rouges 2 long
Coupes 2 à 3 pouces



Brun foncé stipe, lames 2 long
255 continuant bas foncé Stipe bleu



Ojaire blanc lames plus long



Culex des bois de Green R
long. 4 à 6 mm roux abd. brun
ab. c. segment. parsemé de gris et bruns inf.
Ailes veinées oblique Ant. ciliées



Coccus Silphium trifoliatum
Long. 1' à 1' 1/2 mm pale olivâtre elliptique
couv. dessus présent c. blanch.



Cladonia lichen solide blanc. Cap. lisse conti-
nuu. Lame 2 long. Parid. Infl.
couv. rouge lisse brune



Marche aux poix verd bruns corselet
brun abd. gris ailes longues olivâtres
m. allongés

~~de~~ Libellule blanche à ailes noires



Jaune pithache lisse
long 1 pouce large 2 long



Blanc. Cladonia
Par. lisse lisse ailes



Rouge. Couleur blanche
long. 2 à 4 pouces



168 Ent. Souci, liseré Jeune et
4 long. Stipe 1 à 2 pouces

169 Aphis Salix grisea

Oboval ent. jaune pale Ant. &
app. très courts

170 Aphis Knobelia purpurea Barnard
oblongue. brune Ant. long app.
all. Verte beige tête étrange

171 Neotilio nigra


1 à 1 3/4 p 2 1/4 total 3 p
Elong. 10 p Barnard

ailes 0. à 2 bruns pale 0. long
3/4 l. corps couv. dessus gris noir
tête brune 2 nœuds n. m. n. m.
m. m. pale dent. comme Verp.
phainope



Merulius bicolor
Cap. brun inf. grise
Numerous ramifications
long 2 à 3 pouces

122. Muche laniops 4 l ble ou gris
rayé verd & noir bruns. Corp elliptique
brun, abd rugueux unq. livres.



123. Orangé ferme taches unq.
ombilic plan doree au bout
lame 3 long continues filtre
1 poce

124. Lemur ^{mine} simple elliptique
tsp. 1 dent racine longue
brun continu amphi



125. 8 po. Corps brun, tache
brun & long. Centrale
cor. plan concave unq.
mamill. tout dessus

Cyclocorus leucostomus

Diffus. oblique irreg amphi
Cor. Membrane blanche
int. noir à cellules

super pleine de
petites noires

Hg. Endonius

126. Henderson Aug'



Limax gracilis
long. Nat. 2 long. Cornes brunes super
les 2 inf. cornes rouges, tête rouge, cou
grise, Mantoue rouge grise, dos et
2. brun, flancs corps blancs
tale, queue aig. marron. inf. bleu sept.



Limax nebula

Ent. variee en dessus de petites tache
grises et rouges entremêlées, nez gris
bleu, que corps gris obtus portent
Anten. brunes - sur Champigny


127. *Limax livida* - Aug sp. Ent.
brun livide dessus, gris pale dessous
Cornes roses.

128. Falco leucostomus, Fishing Hawk
Milan noir et blanc

Ent. blanche sans tache, dessus
de tte, ailes et 2. noires, 2.
fourchue. Bec et pieds, pieds jaunes
Mange poisson

Rare Henderson

Mr Audubon
Allegh Valley
May 1809



Chitub. des dunes
au Hst de Mississ.

Yellow Paint of Stage
Merispermum tinctorium?
Rad. tuberosa Cauli unifoliis
fol peltatis subcord. acutis
basica biloba 5 perma rubra lutea
struth. ciliatis

182
Mountain Paint
Islands of Mississ.



Racemif.
Rouge int.
bulbi album
peti. l. car.
et tenui -
meme les
Mains
2 to pounds
per apprend.
le Sier et



Salmon Pike


Esox fusciventer

Long. 4 à 5 pieds ent. blanc à bandes
brun. stries courbées brunes, May
de 6 à 8 brun, chair excellente
le plus en gr. plages blanc dans go-

Spalax vittata R. Bannier dent
fauve à 3 rayes brunes L. 7 p^{as} Bois
bl. de fourrure Vit de fruits



Dipus megalops R. Orbl. int. C. gris 2. ^{muf.} bar.
Grand Nat. bl. muf. noir - gr. noir
gr. gris



Bourres of Kent.
Ainsi ne saute pas
Vit de fruits

Wood Rat. Black off 2. 2. sans flacques
Gris. Mice lepus col. off 4 non rouge gris
coupe Lemur. Lemur. Lemur




192

Bois Kent.
Champs
Pate fer
petits lacs
6 de.
6 man.
pectoralis



Oeil petit
Ventre blanc
Lemur vittatus - Long 4 pouces
Fauve à 5 bandes blanches, celle du do.
S'étend jusqu'sur le dos. 2. long.


Gerbilles
Dipus lesmurus
Long. 6 p^{as} dent 2. 3.
Oreille blanche int.
Queue noire, tuffe
roux du Corps
Sante dans bois de



8

n 6

Cricetus fasciatus Ray. roux à
bandes noires -
blanc inf. poche
est. pendante
et l. v. m. Sac.



Corn Mice



Musculus melanotis - au foret -
L. Didelphini - long 5 p. 22 p. lart
gymnometri Ventr. blane - On vole et t. 61.
vult. 2. vire grise - mange Maye

Badger rayé de noir ¹⁹⁵ L. Fred
Hind roux y à bandes noir,
Groundhog Marmotte Brun pâle
Lynx cru diff. blif 3 ray n 2. defles
196 - noir à pinceau L. pallidus M. p.
Gaufrage Copper Prairies, int. Buffalo
Red Gray & Black Fox beau noir jet
Elk rare Oller & Fisher
Porcupine - rare
Norway Rat. Beaver, Muskrat



Tch. Obi. 35

16 1 pds long White eye
Brun à raye Noire et claire / noir / ore
92

blanc. defles
6 dents milles 2 canines à
ch. lour. et 2 à la mail inf
canine ronde blanche antérieure
Yux g. au jaune
ctg. *Pogostoma leucops*.

Dr. 193. *L. maculatus* ^{lemon}
 Dr. un court & large à points noirs
 4 à 5 po. Tenuer, chevrons
 Dr. vert à menton rouge. 6 à 7 po. Nette
 lez. barre 2 ^{en tenu} gris tem. & huile
 lez. mississ. ^{en tenu} gris tem. & huile
 lat. minata 25/100

- Graft Frog. Bois taule Cris. jaune gorge
 Whistling Frog. Bois à menton guttreux blanc
 - Helicoppe. Ben appelle fish R. siphon R.

- Silver Snake 7 à 8 pouces, ent. argenté
 Bande Sn. 15 à 18 long. bl & bleu vif ent.
 - H. Snake Brun 5 à 6 pieds, laches irrég.
 Black Sn. à gorge rouge. bl. Japon. 3 à 4
 - Racer ^{8 1/2} Ent. noir vent. bl bleu poil.
 - H. Snake Brun à taches noires bl. Japon.
 Copper Snake. ^{7 à 3 ft 2}
 - Rant. Sn. Brun ~~a rayu longit~~ mire
 - Blue Sn. Ent. bleu 12 po grande joli
 - Water Sn. brun pale à tache brun int. 5 pieds
 orange & 1 po ent. gaff. C. ichthysphay
 - Swamp Snake - long. 2 pieds Vent.
 brun à taches mire oblongues, gorge jaune
 Moccasin Snake. Gant de cuir
 - Barren Snake. gris à points noirs
 long 14 pieds

Bodianus ² calliope on N. G. Ich. Oh. 34
 N. G. Aplenturus Bat. bello perch
 off Long Island or Brich Perch
 or Red eye.



Vent d'ig mar. band & rayes noires. gaff. ^{latt.} jaune
 Blanch ceperus Oeil rouge. 8 à 9 pouces.
 1. G. ringed



Perna nigropunctata 1. punctata
 Black Perch Latt. brun à
 points noirs - dor. rouge noir
 long. 1 pied ventre

Serranus punctatus



9^e
Corp. noir. Band noir à raye
d'or. Ailes brunes.

Buffalo Grouper
terrible aux Wreck et Chez
en Juillet. Tous les Ch. en sont
dans les Marines, ils tombent
en faiblesse, fait nombreux poiss.



Yellow Goat 3 noires
sont longues. Dos. dos.
ent. jaune, ailes brunes
punctuées, Abd. Verte-
nous marquées, mais
peuvent faire



Horse Goat 4 a 5 vent. rayas
noires fond brun
pig. sur la tête le ciel
ent. vertes, pas claires
Mâles
attaque le
Vestiment pectoral
excl. petit

Loxias emarginatus

Serranus

Flying Calendula

220 Ardea fusca. Butor brun 18 p²
Cint. brun foncé, cou noir clair
blancs espars sur les ailes, fines
jaunes. Housse d'Milan

Un autre sans bandes Cyprinodonephes

221

Ich. ph. 58




Brun. blancs dessous Cyprinus
Catostomus fasciatus, pris-cess
ouvre — tête tubercule pig. pigment
Sunfish — Lamprey Com. Phialid

222

Ich. ph. 77.




Anguilla latifrons
d'à 2 pieds de long,
noire dessus, blanc dessous
tête plate, queue large —



A. nigricans tota nigra tenuis
Tremper reticulata

Whitefish Omerus albula
in the Walash

White Chin - Engleph. argenteum



Musculus niger - Blackrat
or Wood Rat -

Citellus viverrinus, ventre noir gris
2. pl. longue que le Corps noir com-
melle doré, vit dans les Bois
Court visé, mange fruits.

Lemmus talpoides, aff. Lem.,
Vittatus diff. var. Cretzschm. D'Im-
berni gris obsoletus, pieds courts
2. Sembl. ventre gris blanc

Grand Mice & Snow Mice
font des terriers comme la Souris
vit de Racines, eichy sur terre sous
la Neige entre elle et le terrain
sous mangent les plantes tendres.

Blae Agave attenuata
Stipe $\frac{1}{2}$ p' cyl. bl. blu. int.
central bl. diffus conc. gris
blae laminae long. soft blae

Spa argentea Raf. " "
non Mol. of Kentucky long
descendant 26' h. p. ent. d' un
gris plombé argente, ventre
argent. Poils courts de
ir.


Picus ruber. Great Fox Squirt
d'un beau rouge de brique
si le ventre qui est blanc.
plus gr. des Cuvants 2
ch de long 3 fois plus gr.
bulk) quelle gay Squirrel
étrange Scut. dans le
Missouri territory ^{Sieds unis}

pi. alra ²²⁹ Black bumblebee
ay 2 poies très grosse ent. min.
dont sur le Ventre une grosse
ficelle pleine de miel adhérant
au Celle.



Musculus niger - Black &
Wood Rat -
Cutt. vivante, Ventre un peu g.
2. pl. longue quille Corps noir
celle d'automne, vit dans les 23
Court vite, mange fruits.

Lemmus talpoides aff *L.*
vittatus diff pas Caud. ent. =
beau gris d'automne, pieds com
2. Scand. Ventre gris blanc
Grand Mice & leur mi-
sant des terrains comme la 7^e
vit de Racines, en hiver terre,
la Neige entre elles et la terre
pour manger les plantes tendres.



Bleu Agaric Agaricus
Stipe $\frac{1}{2}$ p. cyl. bl. bleu int.
centrale bl. diffus conc. gris
bleu lame & long Septembre bleu

Talpa argentea Raf. " "
Common Moles Kentucky living
5 pouces dont 2 $\frac{1}{2}$ p. ent. et une
boue gris plomb argenté, Ventre
argenté pieds couleur de
Chair.

Sciurus niger. Great Fox Squirrel.
Cutt. d'un beau rouge de brigand
hors le Ventre gris et blanc.
de plus gr. des Lourdes 2
pieds de long, 3 p. plus gr.
(en bulk) quelle gay Squirrel
Se trouve tout dans le
Missouri territory *S. carolinensis*

Apis Atta ²²⁰ - Black Bumblebee.
long 1 p. très grosse ent. mince
postant sur le Ventre un grosse
vesicule pleine de miel dans une
balle.



2000 Corn Cuttings	30 farms over 16 a.
500 Corn	126 12 bush Corn
200 Corn	f 1 a. & $\frac{1}{3}$ Acre
30 Wheat	Wheat &
30 Orchard	
50 1/2 Acre	of 300 Acres -
10 Orchard	
200 Wheat	
150 L.	
100 Party	Pumpkin 1 a. Oil
25 Honey	Honey 1 a. Oil
25 Flax	
150 Oats	
3 Madder	
3 Fulling	
5 Rape	
400 Meadow	

450 Male 200 Ch. W.
350 ♀ Female

Torrey

Tobacco fly gris vif tache
brune sur ailes ent. velu 24 pales
tels à raye bl. devant bl à tache
brune.

Big Horse Fly 1 Inch lg.
yeux vert végétal
tête la tête much noir
en g. telle sorte m. noires, ailes oblique
tache de brun corps brun à pet
tache rouge. Molt. 8 eggs

Robt Lee Woodbridge N J May 4th
Nat Soc. for Field & Lab. Science
Offer \$1000 himself for said
Enterprise

Pop. Mus. de R. I. M. O.

233

1. Medion. bai à taches rondes
noires, ailes noir et clair un peu
brun et rusp. ext. ant. - à clair
2. Grand jaune brillant
3. Medion. jaune Citron
4. Petit jaune paille
5. Petit. Bleu d'ardorge
6. Grand jaune & bleu post.
7. Grand bai à rayes noires q.
8. Grand noir à taches et rayes
bleu - un ?
9. Grand jaune rayé de noir
10. jaune pale à rayes noires de noir
dans bandes dans t. t. - grande

243

12 August from Hendersonville
to Cabb. Creek — 3 miles
To Mr. Alvis — 2 m

13, 14 — Rain

15. Sun to Diamond Ferry 7 miles
12

To Blackford Court house
Spring 5 m — 6

To Springfield by the
upper branch of Big Cr. 10 —

To Harmony — 8

18 Little Prairie 2 miles

20. To Mill 2 miles

To Wabash 1 m Down to

To Shoo — 5 m

To Big prairie 3 m

To Little Wab.

& Conaway — 5 m
18

Return 21 To Springfield 8 m

To Blacks mill
on Big Creek — 2 m

To Blackford — 7 m.

Cove Creek 1 m
Hills 3 m
To 2 branch 2
To 3rd branch 3
Ridge 8
W. Kenham 7

Green River 2
flat yellow banks 12
Yellow Creek 5
Gogiby 19
Sug. Head Gogiby 10
Horse Creek 6

Davies & Brantford 9

Blackford Creek Valley 3

Fall Creek Ridge 2

Honey Locust Cr 2

Ice Spring Fork 3

Beech Hill 2

Clover Creek 3

— Creek 6

Hardenberg 1

— 30 15


No. 1 to Sugar tree Camp Cr. 3
 - Barren 1
 Head of Rough Creek 4
 inking G. 3
 St. Ruth's, St. Ruth's Hill 2 3
 16

In Croft road
 Coxe 5
 Miller Creek 2
 Pl. in clearing
 Macaulay 2
 14

In Basement 1
 End Do 2
 Fair Spring & Adm. Run in
 Valley of Salt 1
 Salt River Westport &
 Williamville or Eastport 2
 Swamp Ohio 2 1/2
 Lemuria Swamp 5
 1/2
 1
 16

To Big Run 3
 Mill Creek 3
 Pond, mill, Dam and Church Humps
 To Louisville 7
 - Shipping port 2
 16

266 1.7 Ver fine brownish
 1.7



Brown Catfish *Silurus glanis*
 Ent. d'un brun plombé, tête imposante
 obte. gape ^{large} irrégulière, barbe égale, lèvres
 & sup. lèvres. Lèvres à inf. nupt.
 Ouv. latérales des mâchoires sur la tête
 gen. et canaux digestifs, dents en rapièces
 aiguës, yeux minuscules

265 *Aphis Bidens coronariae* Verpailler
 Ovalis oblong. tétéd'ore. dv. anordi
 annule, ent. brun virat. base des
 jambes et ant. pale ou blanchâtre
 Ant. égaux au Corps, cippes. ^{long.}
 d'arr. append. Male, a testes ligatrices
 à base blanche très tache. Femelle
 ovalis brun virant noir, app. pt. court.

R.G. Opticis maculatus Ich. obs. 87



Pissen armé - St. Genèvre


Sur le lac Léman. Long. 60 cm.
Gouffre dent. long. 2 à 3 p. Dents.



Slammy Catfish - *Silurus viscosus*
Sott. d'une couleur brune à teinte
blanche et grise. Gorge blanche
queue régulière. Lobe dorsal
sup. blanc petit, épine de moy
durf et point. Caudal spinaux, moy. tan
minces, l'adipose très grande, bord
dur. noir, les trois plats à 1.5 mm
en dessous, barbe courte irrégulière
avec très petit blanc, branchie grande
dents en rang en rapière.


Lèvres très épaisses, rugueuses court
court de saleté. Yeux sur la tête.

Ich. obs. 15 17 *S. superbus* diff. 2 Kd. 15
eyes ellipt



Yellow Catfish. *Silurus v. Notatus*
Lutes. N. sp.


Sott. d'un jaune très pâle presque jaune
lutes. les nage. opacité adipeuse. Toute la
part dor. à epine très grande obtuse -
barbe moy. tête déprimée oblique -
ventre comme l'autre long. clément
sur le dos, rousse avec la 2^e nage. adip
Mach. sup. pt long. dents en rapière en zig
zag




Holocentrus flabellatus - Jam tail
or Black bap. long. 2 pines

Brown olive. à bandes transvers.
brunes, une tache noire derrière l'opercule
qui est épaisse, une tache jaune au dess.
point. Un brun et deux int. Jaune olive.
à ray. flex. vicino, Moy. dur. ant. olive
au bout, pointe ronde, les autres plus ou moins


écaillés ciliées, ventre à abond; taches.




2.11.
Holocentrus pallidus an das H.
punctat. I. H. trifasc. diff 3 rayes
sur l'open. à peine percept. Queue
jaune pale terminée de brun -
Ent. olivâtre diffus et bleu. Septes
lues taches, une tache brune à
l'opercule.



3.10.
Holocentrus trifasciatus Yellow Bap
aff H. punctatatus Diff 3 bandes
oliv. sur la tête. Cap. tout pointillé
de points very. very. des clav's -
open à rebours. peu appr
very. diff. very. de



2.12.
^{Catet} Cyprinus melanotus - Black Chub
Corps pr. cylindro. tête conique. diffus
obt. bouche ouverte infér. à lèvres superficielles
semi-circul. tête haut. lèvres point
de dents sur lèvres 3m. very. tout le
diffus noir. Génital. Prof. blanchis
gray. Diff. et lèvres. superficie rouge.
les autres blanches; ligne lat. oblique
lentille nictitante.



2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20.
Sciaena blennioides L macrostoma
Blunt-nose. Long. 2 à 3 pouces
Ent. very oblique gray. Diph. à 37
taches brunes et des zones rayées accus-
sées sur les flancs. Queue à ligne brune
peut aussi. Diff. à rayes obs. verticales
Muf. en cannes. Cuv. und, bouche
peut à peu dents. maxill. inf. jet. croch.
2 Ray. diff. juv. en filet. Diff. open
sp. non levé. And g. q. vis. ministris
caudale ciliée sous à rebours



21


Lymnaea hyalina oxina
 Olivâtre 4 l. de long bouches
 oblique aux emb., obt au bout
 5 spires d'emb. amplifi', le
 dos - puyre crenu

225

*Lymnaea scalaris*

Olivâtre 5 spires fl. crenu - ga
 poudre bouches nuds oblique - tour
 imp. anguleux à leur bouture

230

*Lymnaea scalaris**à 2 lobes ult. semblables**de *Pleurotoma* *Pleurotoma***Var à bouches marginées oblongues**oblique*246 *Cyg. de Sinking & Otter Creek*

Ent. bouches gauches diff de
 la pointe plus bouches nuds
 6 spires bouches fines, 1 très
 plan prolongé
Lymnaea tigrina

250 *Pleurotoma unicolor*

Noirâtre 6 spires également
 tiré en tronc et long 1". - cleft
 6 1/2 spires qui a une sorte longitudinale
 pour le dos, puis du côté est et
 décurvante vers le 2^e spire

Bouches nuds crenu, espacée au bord sup
 crenu - sur la partie bordure

255

260 *Pleurotoma varia*

Noirâtre ou olivâtre
 9 spires, aux p. bouches
 ayant chacune 3 ou 4
 rangs de varices oblong
 terminales formées
 par des clefts interrompus

Bouches en forme par des bouches
 aux p. bouches, après l'ult. en bout Sinking


Lymnaea levigata aff. scalaris

Rouge ou olive brune, filet d'op.
 1^{re} b. grande bouches au bout

270



207 Ich.Oh. 57



Long 4 p. 18

14

20

9

9


Cetorhinus melanops - Spotted Sucker
 Corps aplati en dessous jusqu'à
 l'anus qui est très oblique, dessous
 de la tête bien convexe, face à la tête
 équarrie plat; dessous, naseau obtuse
 convexe, bouche à lèvres épaisse.
 Blanard l'irid. pt. pointe et plus profi.
 des pet. tubs. un peu latér. un peu
 de los le 1^{er} Operc. Opere double lèvre
 aiguë, des max. olivâtre à reflets
 violâtre, une grande plaque un peu
 entre la d'irid. et l'anal, flancs
 pale à points espacés noir, ventre
 blanch, tente le Nag. curieusement
 un peu pale, dentes obtuses
 grandes ouverte radice

aff lat. sp. sp. aff.

Amit ouvr. bivalve à iris brun à
 cache des intérieurs

208

Ich.Oh. 49



16

8

9

24

Hydrangya interrupta

Yellow Club Long de 3 p
 Calt. Olivâtre jaune clair et aux
 dessous, dessous de la tête, branche
 une ligne jaune de la d'irid. à la
 l'anal, ligne latérale interromp.
 et courb., point de rebrousse à la 2^e
 ligne band. peu appos. à reflets
 violâtre, bouche grande sans dents
Mi argentea aff. *H. rotata*
 même forme du Corps, dte. avec
 max. obtuse

28 *Triodopsis labiata* N. G.



Long. 5/8 p



Long. 4/8 p



boult. 2/8

H. tridentata Say
 Diff. *Inphedon* pas ombilic.

Bouch. oval. à large lèvre en rebord
 blanc, 1 dent à dr. lèvre obt. et plus grosse
 sup. au centre sur l'ouvert. Ombilic grand
 inspirale, strié, à stries un peu flexueuses
 5 pires la centrale lèvre peu convexe dessous
 C. L. Blanard ou toutff. un blanch. pale

Sel' now à lign. flex. tronc fer
et tache blancheuse vis à flexuose

Swift Racer. Bleu à raye jaunes
2 tache tres lauré cyanosante
Henderson 265


66 Blue Crane - Ardo

Bois long de 2 p' jusqu'à l'event -
compt. obt diff et diffus, noir sup
jaune inf. mand. tache sup serrée
à rebord de bout sur ventre

Pieds esp des gen. à oreilles noires
ongles tout bordure obt, nombre esp.
lèvre noir ventre blanc, lèvres
diffus tête inviolate sup huppé
à gr. tache blanche sur ventre
Coeur blanc, lèvres virent diffus
et noir dans le jusqu'à la gencive
inf. l'langue sur le ventre, des
lèvres et 2 bleu cendré, les 2 points
de l'oreille blancs, lèvres pliées au
sabot blanches pendantes, Coeur
long et grande, lèvres. Epingle
hautees 3 1/2 p 5

D John McFar Williams
Stat Ky Lexington

Violaceum minor Gentian
Ledum larvatum D. glauca
Clethra alba Cephaelis hirsuta
Grimmia racemosa
Brachykt angustifol.
Himantium lithosoma Thys. Ward
Olfacaria Ging.




Silver Finch - Grand Nez
sup long per opér. long. long 2 1/2 p.
long. 2 1/2 p. Diff. Poisson et Lépidomes
Nas droit et droite opp. point d'app aux
pet. point de clevis. Mach et hupp. scutu
operc. dentif. aux. et aux. membran. ^{sous le cou}
aux. p. p. dentif. aux. et aux. membran.
ent. coryphaea. scutell. rugue. gg. t. ent,
brun. bruns. sur le dos, arrondie doré
à la base de la queue. sur le dos. rouge
doré. bout d'lo. 2. et Nas. D. et H. P. r. v. t.
doré. olivâtre. sur le Nas.

Barrythee
 Probaltane
 Augise
 Oxyphope
 Sulphide
 Chidone
 Sidar
 Figole

Centrifile
 Centrifuge
 Cxal motion
 Calorique

univ. Intelig.



26 Potamides incarnatus
 long 1 $\frac{1}{4}$ p. long. 1 p. diam 2 $\frac{3}{4}$ p.
 axe 3 $\frac{1}{4}$ " Litt. bruns ferme
 ext. et coulure de bois laissant
 un sillon recto, connectif
 oblique à gauche. Camée unique
 fossile profonde, doré & noir


1 Box book. Pl. II. Bay Factor
 Capt James Curran 16th Feb. 1804



Cocodiles pochisomus, Msp

Vu à Louisville en 1802

Litt. certaine écaillles le round,
 embig. corps spes cylindro. Queue
 lte et pieds courts, long totale
 2 $\frac{1}{4}$ pieds, queue 9 p. tte 6 p.



N.G. See Lyymna gibbosum
 27 Ellipstoma gibbosum

Boule elliptique entouré oblique
 à levres épaisse. L'est. à une dent obtuse
 ou forte ext. l'intérieur dilaté vers
 umbilic. — Conique ovale courbée
 tte obt. à la fine ext. oblique.

271 *Aphis Cynips alternifolia* Sept

Brun olive, ventre un peu plus
brun. de l'abd. vertébrée, aux bosses
au p. long. que le corps qui est oblong,
obt. curviform. tête oblique bruyante
append. allongés divergents, pieds
à 3g. anneaux plus ou moins distincts
Mâle à tache obt. noir aux ailes.

272 *Aphis Sanguisorbae amphibia*
Aphis alternifolia

Rouge de sang observé des rameaux
appelés des ailes blanches, appendages
aussi divergents, Abd. noir à
bord. plus ou moins que le corps. Pieds
noirs à ailes espacées bout blanc.

Cynips alternifolia id *Verbascum coniiferae*

Chicken Hawk - Brun.
L'env. 3 $\frac{1}{2}$ pieds. long. 1 $\frac{1}{2}$ pied.
Bez. tache blanche dans la partie abd.
vertébrée. Abd. brun noir
de fauve. Ailes de 1. p. noir. C. ventre
peu noir rayé de 2. noir rayé de
jaune. Tache jaune à grise.
Le poitrine. Tache jaune à gris.
Le poitrine gris. poitrine et flancs jaune
à gris. tache blanche dans tache
vertébrée. poitrine à jaune. tache. brun
brun. les ailes inf. tachées de noir et

273 *Caprimulgus*


Whippoorwill de Louisville

Pieds courts & bruns, emplois jusqu'à un
talon, doigts courbés de brun et blanc
4 doigts, le post est latéral pres, un
talon au devant. Les 3 ant. ont une
pet. membre à l'base nommée Gallinier
les ongles noir l'interieur noir et
couverts int. Des petits ongles blancs
comme l'équerre noir court, pointe
de la bouche très étendue. Mâle noir
noir, long à la queue.

Fem. brun ou Diphys, noir sur
la tête. Corse des ailes de la poitrine
marbrée blanche noir. Ailes à tache
blanche au fond et à bord bleu
couvrant les 5 premiers, l'ext. blanche
l'aut. noir. Queue fourchée à 1 $\frac{1}{2}$ pied
obt. dont toutes les 2 parties
ont une tache blanche sous le bout
noir. Paire de membranes couvrant

Diphys à C. C. noir. C. noir à
la gorge, ventre noir transversal
de blanc et blanc. Q. et C. do.
Pétrant brun à tache noire. Jeu.
.t. et flancs espars. tache. tache.
L'env. 23 p. long 2 $\frac{1}{2}$ pieds dont
la 2. 4 p.

A. Crapp.



275 *Potamides striatus*

Long. 2 p. larg. 1 pp. Diam. 1 p
Ax. $\frac{2}{3}$ à droite ou de cot. Ile
Comme 274. Forme obsolet
elliptique à une bay. dépression
longitudinale, très rugueuse trans
versalement. Brin. oblique. Stries
de murex parvile, longitudinale
flexueuses, nivées, larg. espacée
int. "Violace" naine". Comme 274
lateral vertical, Camée obt obt
dents grosses obtuses peu stries
peste profond, fosse oblongue

276 *Clyptoloma* n. nom.
30 *Amblema* emittens. fluviale
Blancat par roulement
Amples. Oral obtus à 5 spires
rugueuses aux suture, la texture
diurnale amplie latéralement en bout
des int. bord, ombilic un peu forte



31. Denud.

277

N.G. *Omphalix*




Fragile, diaphane, coquille laissant à
peine trace, 5 spires, dépression larg. ^{un peu}
brûlé par l'animal, l'ouverture larg. est
obt. excentré sur la moitié, branche grande
perpendiculaire, bord. aigus débordant
en é. bout int. réfléchi int. sur l'ombili
que qui est profond

278 32. *Omphalix* mega endospira



Ent. blanc. ou un peu rougeâtre à
peine trace, forme de Planorbis endospira
ayant un très grand umbilic en spirale
déprimé. plan. ou larg. convexe à 5
spires. Branche elliptique larg. oblique
flexueuse inf. à l'abord large nettoyé
les 2 br. nivées par une plagine
au rebord appliquée

33. *Omphalix* fasciata



H. attenuata aff. say

N. G. Henodion ^{parvula}
Totaniles diff. comme tif et sur la papi-
milles, dents étoilées carénées



Cyg. brune en vin
Cylas similis int. liss. superficie
long 3 l. larg 4 l. épaisseur 2 l.
axe du centre de fixation 5/52 mm

34



35 Omphalina ariensis
diam 2 à 4 l.

Ent. rouge couleur de chair ou blanche
ou lisse ou à fines stries de fer et au milieu
en depression, trich. sur les bords en depression
profonde. 5 mm. 36



Omphalina
trichypenia
larg. 2 à 3 lignes
Blanc ou bleuâtre ou rougeâtre, peu lisse
de fer, trich. int. 6 spires bombé, tranché
oblique, umbilic. un peu. margin. pas. la
bord int., les 2 dernières pas une nappe

Autres 2 . Trinacriae 2.

Chambodes (Kornius Raf.)
Stomias Duf. sp. an. lar.

Chionoceras Antennarius cornuta

Mile 1760 yards (10 ch long) 161 Acre
Per. 4840 Yds Chain 22 1/2
4 rods each 40 rods. (x links)

Mile 1760

Chain 22 Y or 66 feet long
Rod

36 Omphalina dubia, mycenne entre
ariensis & O. sp. hypenia, ayant la
forme du 1^{er} et l'ombilic du second
petit renommé



37 Trocholites scabrum
long 1/8 p long 6/8
hauteur 3/8

Brun ou brun rouge. 97 à l'entre
des ailes. 3 spires bombé, une large
le dernier bord de spire, scabre tantôt
lateral par des petites papilles rugueuses.
Bord à bord. margin. lissante bleuâtre
int. aussi que l'entre 1 dent optique exell.
large. flancs.

291 Checker Bird fém. *Picus*


Doz. ray. de blanc & mirette. Ailes
do - Bleu brisé, pieds oliv. tête surpl.
vairé de rouge. Clapet, dessous des
C. gris roux. Ailes à 9 plumes. Poitr.
Spine. Courte queue. Ray. à 2 per lep.
aig. per lat. poitrines.
Long. tot. 9 p. Lm. 16 p.

292 Tatter Bird *Sitta*

Long. tot. 5 p. Lm. 10 p.

Doz. et dessus g. gris ardoisi, dessus
tête noir et dessous C. blanc.
Bec noir. plombé à sa base. Inf.
plus plombé. le 3 d'ant. unif. noir
à leur bas. Cuisse et cramp. rouge
Ailes dessous plombé. Cuisse. grise
tot. bleue ext. noir au mit, dessus
ent bleu bleuetre 17 perne. Courte
queue à per. lat. noire. tenu de
blanc —

293



gauche

droit

avant

40 *Planorbis perigordi*
Bouché un peu oblique
obt. angul. sup.
Olivâtre. Mit. 1 angle
à gauche pr. Circulaire
2 spines inf. concaves
Stries, à droite à 2 spines obt. angul.
ombiliques. *P. trisulvis*

294




gauche

droit

avant

41 *Plan. stromatia*
Blanc. bouché
larg. dilaté inf. cunuliforme
2 spines ch. ch. cot. angul. angles aigu.
Ombilic à gauche, concave à droite
à peine Mit. — *P. bicarinata*

295



42 *Stellix marginalis*
Diff. olivâtre rongé
blancâtre, blanc et noir
toujours à lèvre marginale
le blanc int. la partie nappe entre elle
6 spines fait stries, formé en dessous
leg. apparaît d'ombilic dans la partie
G. albolabris

N. G. *Stenostoma*, diff. Trophéum
par bouché linéaire bordée par des
lèvres unies appliquées sur la coquille
une lame longitud. inf. sur la lèvre
inf., et une lame inf. à son extron.
Lèvre sup. échancrée.

293. *Sternostoma convexa*. 296.



Long. 6/16. larg. 5/16.
haut. 3/16.

Prague ronde & lisse, convexe
d'espèce et d'espèce à 5 spines
Angle obtus séparant les
2 cotés point d'ombilic
Lèvre débordant au dessus ext.
et dessous, bord aplati appliquée
Carène très saillante sur le
bord de la lèvre inf. lèvre sup. obtuse
Coté blanc et pale grisâtre dans la moitié
blanche de

297. *Stellaria globularia*
H. *emarginata* L. N. G.



Toxostoma diff. d'Helix pas
bouche étroite arrondie sup. à

Cette esp. ne diff. absolument
du Sternostoma convexa que par la
bouche qui est sans carène ni lèvre bombé
lèvre sup. échancrée obtuse au milieu
Forme encore plus convexe sans carène
arrondie et sans angle séparant les
deux faces, 5 spines plus haut
hauteur 2⁸/₁₆ - 4¹/₁₆.

298. 45. *Omphalina sternostoma*



Blanc et peu brillant long et
larg. 3/16. hauteur 2/16. Petit



ombilic, bouche linéaire arrondie
à lèvre aiguë deux lobes peu convexes
des deux cotés, lèvre dessus, très striée
dessous à 7 spines - blanc.

47. *Odonostoma flexuosum* 259



Très simili à Od. granulans
diff. couleur blanche et non plus grise
plus crachée cependant pour cette Odonostoma
est moins coloré avec la carène non
granulée - long 6/16. larg. 5/16 haut 4/16
cinq spines convexe et haut. 5 spines

48. *Trochopsis lunula* 300



Bouche grise

long. 7/16. larg. 6. haut 3.

Blanc et lisse dessus
brun, plat et à peine strié
dessous - Ombilic lunaire
bouche étroite à très large lèvre
marg. dents obtuse sup. pet.
l'est. grande coquille interne
l'inf. caréné et rebordé


301 49. *Trochopsis atrata* L. N. G. 3. 301

Diff. *Trochopsis* pas ombilic mal et des
Infractiles pas 3 dents aff. In. scabrum.
et C. pectinat



long 7/16. larg 6. haut 4
Blanc et rouge, ou blanc
Toxotoma trochopis pale sup. strié inf. et un
peu convexe. 5 spines, bouche comme les
precedent, mais à ombilic mal ou cassé


1502. *Myodolum maculatum*



long 7. larg. 6. haut 3 1/16
Rouge à tache et flage. lèvre brune
2 tache blanche dans la lèvre ext.
5 spines à peine striées, lèvre marginée
reflectie blanche fléchie mince à la base inf.
dent caréné obtuse

Brachytrypa longana
Scaphopode

face
303



304
perforata    N. G. aff Cycloceras
cl. "dorsit"
Mostynites perforata.

Fossiles Bansf.

305. *Mendon impreustum* Trocholites
  Long. 6. larg. 5. hauteur 4.56.
Rougeâtre pale à gg taches
brunies, 6 Spines à peine striées, leurs
blancs épaissie réfléchie enfoncée dans
un creux ou saillant umbilic, dont un
carène allongé

